



27 Мар 2025

Описание лечения и рекомендации

для  Мияко

от ветеринарного врача Новикова Тамара Юрьевна

Жалобы владельца: вчера ночью заметили рвоту. Вечером дали курицу. После приема пищи или воду - рвота.

Рацион: сухой корм, сметану дают немного

Аппетит: целый день к миске не подходила, вечером только курицу

Мочеиспускание: не наблюдали

Дефекация: вчера вечером, оформленный, без примеси крови. Иногда бывает сформированный стул с прожилками крови

Дегельминтизация: летом 2024 года

Вакцин. статус: нет

Рвота: белая, непереваренным кормом, коричневого цвета с резким запахом, более 3 раз за день

Стерилизованная

Осмотр: ВСО бледно-розовые, СНК 1,5 сек, носовое зеркало чистое, ротовая полость чистая, без изъязвлений, тургор 3-3,5 сек, брюшная стенка напряженная, шерстный покров ровный, кожный покров без признаков дерматита.

Проведено:

Уз-исследование

ОАК+БХАК по оптимальному профилю

Фалена 1мг/кг п/к

Мелоксивет 0,1мг/кг п/к

Анальгин 25мг/кг п/к

1. Диета **гепатик или гастроинтестинал** курсом 1 месяц, в монорежиме.
2. При отсутствии самостоятельного аппетита, **кормление принудительно**, через шприц, без иглы, в объеме 15-20 мл каждые 3-4 часа, кормом в виде паштета.
3. **Анальгин 500 мг** по 1/6 таб 2 раза в день, курс 7 дней.
4. **Урсосан 250 мг** по 1/5 капсулы 1 раз в сутки, курсом 3 недели
5. Дальнейшие рекомендации и назначения после отслеживания динамики состояния и получения результатов обследования.
6. Готовность результатов анализов 28.03.25г. после 17:00. Консультация по результатам анализов крови 28.03.25 в 19:00.
7. При ухудшении состояния, рекомендовано стационарное наблюдение и лечение. Ориентировочная стоимость 10,000-12,000руб за сутки. (Сутки считаются вне

зависимости от времени поступления до 12 часов дня).

При ухудшении состояния или появлении новых симптомов незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.