

ВМБ "Объектив"

Адрес клиники: Санкт-Петербург, Красное Село, ул.
Юных Пионеров д.38, пом.415
Телефон клиники: +7 (812) 605-87-60



ФИО владельца: Макаренко Диана Александровна
Лечащий ветеринарный врач: Семенова Анна
Алексеевна

Кличка: Сева
Вид/порода: Кошки / Мейн Кун
Пол: Н, возраст: 3 м. 3 н.
Вес: 3.20

Выписка из медицинской карты животного

Дата обращения: 04.03.2025 12:48

Описание лечения:

У кота на цитологическом исследовании диагностирована мастоцитомы кожи с метастазами в лимфоузлы подмышечный и паховый.

Опухолевый узел появился на коже на боку еще у заводчика, но думали это травма. Активно кота не беспокоил.

На данный момент удалено новообразование на коже+подмышечный лимфоузел (операция проведена 24.02.25). Завтра плановое снятие швов. Жалоб на самочувствие не имеет. Активен.

Опухоль кожи и лимфоузел направлены на гистоисследование в Лабоклин (Москва), готовность 3-4 недели.

Диагностика УЗИ - без данных за опухолевый рост в органах брюшной полости. Анализы крови без значимых отклонений, эозинофилии нет.

Пациенты прошли несколько консультаций в разных клиниках по дальнейшему лечению. Обозначена либо химиотерапия (Ломустин/Винкристин/Лейкеран) либо таргетная терапия (Палладиа). Но у таргетной терапии ограничение по возрасту, ранее 3х лет давать нельзя.

На данном этапе с учетом всех полученных данных принято решение начинать химиотерапию Лейкераном, проводить контроль в динамике и ждать результат гистологии. Владельцы информированы о возможности рецидива/метастазирования опухоли, о возможном токсическом вреде от опухоли при дегрануляции и на фоне лечения. У молодых животных опухолевый процесс более агрессивен.

Рекомендации и назначения:

Рекомендован следующий план лечения:

1. Химиотерапия Лейкераном в монорежиме длительно (как минимум, до получения результата гистологии)*

*есть 2 режима дозирования:

- 20 мг/м² 1 раз в 14 дней

- 4 мг/м² 1 раз в 2 дня

*-кот в стадии активного роста, 2 раза в месяц нужно контрольно взвешивать и корректировать дозировку при необходимости. +H2 блокаторы на все время лечения для снижения токсического действия на ЖКТ

2. Контроль ОКАК, БХ крови 1 раз в месяц, натошак

3. Контроль УЗИ обзорное, бр.полости и грудной клетки - 1 раз в месяц, натошак

4. Контроль поверхностей тела и лимфоузлов на наличие изменений.

5. Отмена иммунизации (вакцинации), ограничение инсоляции с 11 до 16:00, избегание аллергических реакций.

6. На фоне снижения иммунитета - может переносить инфекционные заболевания (в клинике не контактировать с другими пациентами).

Корм, режим жизни и общения с домашними членами семьи - без ограничений. Рвотные массы убирать в перчатках и сразу утилизировать.

Вес 3,2кг, ППТ 0,217м²

Препараты к приему:

1. (мед.апт) Хлорамбуцил 2мг (Лейкеран 2мг) есть 2 режима дозирования:

- 20 мг/м² 1 раз в 14 дней (тогда внутрь после еды 2 таблетки 1 раз в 14 дней длительно)

- 4 мг/м² 1 раз в 2 дня (тогда по 1/2 таблетки даем после еды 1 раз в 48 часов длительно)

2. (мед.апт) Фамотидин 20мг внутрь по 1/4 табл за 20 минут до еды вечером ежедневно, длительно (не менее 3 месяцев)

Контроль ан.крови:

- при ежедневном приеме Хлорамбуцила - 1 раз в месяц натошак

- при приеме 1 раз в 14 дней - через 4-6 дней после дня приема Хлорамбуцила

Корм, режим жизни - без изменений.

! Если аппетит снижен - выбираем влажный корм (кусочки в соусе/паштет). Можно рассмотреть Корма Роял Канин Гастроинтестинал, ПроПлан CN/EN, Хиллс I/d. Так же можно пробовать кормить детскими пюре (на мясе)- Тема, Хайнц, Агуша и тд.

При отказе от корма - кормим насильно со шприца (не допускайте того, чтобы питомец давился кормом).

Не вакцинируемся.

Противопаразитарные обработки - по согласованию с врачом в перерывах между ХТ.

Контакты с другими животными - ограничить (кроме тех, с кем живет постоянно).

общение с членами семьи - без ограничений - во время приема ХТ питомец не считается опасным для других. НО если будет рвота - убираем в резиновых перчатках и с моющим средством, тк в рвоте может быть желчь, а в желчи препарат ХТ не метаболизируется.

Следить за количеством потребляемой воды.

Во время приема ХТ возможна вялость, снижение аппетита, тошнота, расслабление стула. Данные симптомы пройдут после отмены препарата, но требуют контроля.

- При наличии рвоты более 2х раз за сутки и снижения аппетита - Серения/Маропиталь 0,1мл/1кг веса п/к (холка) 1 раз в день 3 дня подряд

- При диарее - Смекта - пакетик разводим на 1 стакан воды, выпаиваем по 10 мл 2-3 раза за день

- Если питомец полностью более суток отказывается от еды, вялый, имеется тошнота - обратитесь на прием к дежурному врачу в срочном порядке.

Ветеринарный врач: Семенова Анна Алексеевна